



ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ



ԶԻԱՐ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ-Ի ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ
ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿ

ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿ

ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Օպորտունիստական հիվանդություններ

Հարածուն բազմաօջախային լեյկոէնցեֆալոպաթիա

ԱՍՏՂԻԿ ԴՎՎԻԴՅԱՆ

ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի բժշկական օգնության և
սպասարկման բաժնի բժիշկ-ինֆեկցիոնիստ

Հարաճուն բազմաօջախային լեյկոէնցեֆալոպաթիա

Հարուցիչը՝ JC-վիրուս

Զարգանում է, երբ CD4+ լիմֆոցիտների քանակը ցածր է 50-100բջջ/մկլ

Կլինիկական նշանները

- Աստիճանական սկիզբ
- Ենթասուր ընթացք
- Հոգեկան, ճանաչողական խանգարումներ՝ ուշադրության կենտրոնացման թեթև խանգարումներից մինչև դեմենցիա
- Տեսողության վատացում, կուրություն
- Խոսքի դժվարացում
- Մոնո- և հեմիպարեզներ, ատաքսիա
- Էպիլեպտանման ցնցումներ
- Գլխուղեղի օջախային ախտահարման այլ նշաններ

Հարանուն բազմաօջախային լեյկոէնցեֆալոպաթիա

Ախտորոշումը

- Ողնուղեղային հեղուկում ՊՇՌ մեթոդով JC-վիրուսի ԴՆԹ-ի հայտնաբերում
- Գլխուղեղի ՄՌՏ հետազոտություն. JC-վիրուսն ախտահարում է ԿՆՀ-ն՝ առաջացնելով սպիտակ նյութի դեմիելինիզացում

